活法機要
怪疴單



叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

活法機要

朱震亨著

本館叢書集成初編所選
濟生拔粹及古今醫統正
脈全書皆收有此書濟生
在前故據以影印

活法機要 東垣與察古家珠及劉守真病機保命大同而小異矣

泄瀉證

臟腑泄瀉其證多種大抵從風濕熱也是知寒少熱多故曰暴泄非陰久泄非陽浚而便膿血知氣行而血止也宜大黃湯下之是為重劑黃芩芍藥是為輕劑治法宜補宜泄宜止宜止和則芍藥湯止則阿子湯有暴下無聲身冷自汗小便清利大便不禁氣難喘息脉微嘔吐急以重藥温之漿水散是也後重則宜下腹痛則宜和身重者除濕脉弦者去風膿血稠粘以重藥竭之身冷自汗以毒藥温之風邪內縮宜汗之驚濇為病當温之在表者發之在裏者下之在上者湧之在下者竭之身表熱者內疎之小便澁者分利之盛者和之去者送之過者止之除濕則白朮茯苓安脾則芍藥桂枝和血則

黃連當歸宣通其氣則檳榔木香如泄痢而嘔上焦則生姜橘皮中焦則芍藥當歸桂茯苓下焦則治以輕熱甚以重熱藥若四肢懶倦小便少或不利大便走沉困飲食減宜調胃去濕白朮茯苓芍藥二味水煎服如發熱惡寒腹不痛加黃芩為主如未見膿而惡寒乃太陰欲傳少陰也加黃連為主桂枝佐之如腹痛甚者加當歸倍芍藥如見血加黃連為主桂當歸佐之如煩燥或先便白膿後血或發熱或惡寒非黃連不止上部血也如惡寒脉沉或白腰痛或血胳下痛非黃芩不能止此中部血也如惡寒脉沉先血後便非地榆不能止下部血也唯脉浮大者不可下

黃芩芍藥湯 方在寶鑑泄痢條下

大黃湯 治泄痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度久不愈

者　大黃一兩

右剉細好酒二大盞同浸半日許煎至一盞半去大黃不用將酒分二服頓服之如未止再服以利爲度復服芍藥湯和之剩止再服黃芩芍藥湯和之以徹其毒也

芍藥湯　方在宝鑑內剩疾條下

白朮黃耆湯　服前藥剩疾雖除更宜此和之

白朮一兩　黃耆紫色分　甘草炙參分　一方無黃耆用黃芩半兩

右㕮咀均作二服水煎服清

防風芍藥湯　治泄剩飧泄身熱脉弦腹痛而渴及頭痛微汗

防風　芍藥　黃芩已上各壹兩

右㕮咀每服半兩或一兩水煎

白朮芍藥湯　治太陰脾經受濕水泄注下体重微滿困弱無力

不欲飲食暴洩無數水穀不化宜此和之

白朮　芍藥各一兩　甘草伍分

右剉每服一兩水煎

蒼朮芍藥湯治痢疾痛甚者

蒼朮二兩芍藥一兩黃芩　桂各伍分

右剉每服一兩水煎

呵子散如腹痛漸已泄下微少宜止之

呵子皮一兩生熟各半　木香半兩黃連三分炙甘草各三分

右為細末每服二錢以白朮芍藥湯調下如止之不已宜歸而送之也　呵子散內加厚朴一兩謂其邪氣也

藥水散治暴泄如水周身汗出身上盡冷脉微而弱氣少不能語甚者加吐此謂急病

半夏貳兩湯洗附子半兩泡乾生姜炙甘草桂各伍分
良姜貳分半

右爲細末每服二五錢薑水一盞煎至半和滓熱服

黃連湯治大便後下血腹中不痛者謂之濕毒下血

黃連當歸各半兩炙甘草貳分半

右咬咀每服五錢水煎

芍藥黃連湯治大便後下血腹中痛者謂之熱毒下血

芍藥黃連當歸各半兩大黃壹分炮淡味桂半分
炙甘草貳分

右咬咀每服五錢水煎如痛甚者調木香檳榔末一錢服之

導氣湯治下痢膿血裏急後重日夜無度

芍藥壹兩當歸伍分大黃貳分半黃連壹分黃芩貳分半

木香　檳榔　各壹分

右為末每服五錢水煎

加減平胃散方在室鑑內泄痢條下

地榆芍藥湯治泄痢膿血乃至脫肛

蒼术 捌兩　地榆 貳兩　卷柏 叁兩　芍藥 叁兩

右㕮咀每服一兩水煎病退止

五泄之病胃小腸大瘕二證皆以清涼飲子主之其泄自止厥陰證加甘草以緩之少陰證裏急後重故加大黃又有太陰陽明二證當進退大承氣湯主之太陰證不能食也當先補而後泄之乃進藥法也先前厚朴半兩製水煎二三服後未已謂有宿食不消又加枳實二錢同煎二三服泄又未已如稍進食尚有熱毒又加大黃二錢推過泄止住藥如泄未止

爲腸胃有久塵垢滑粘加芒硝半合宿垢去尽則愈也陽明證能食是也當先泄而後補謂退藥法也先用大承氣湯五錢水煎服如利過泄未止去芒硝後稍熱退減大黃一半再煎兩服如熱氣雖已其人必腹滿又減去大黃与枳實厚朴湯又煎二兩服如腹滿退泄亦自愈後服厚朴湯數服則已

癘風證

癘風者榮氣熱附其氣不清鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰風寒客於脉而不去故名癘風又曰脉風俗曰癩治法刺肌肉百日汗出百日凡二百日鬚眉生而止先槌皮散從少至多服五七日灸承漿穴七壯灸瘡愈再灸再愈三灸之後服二聖散泄熱祛血之風邪戒房室三年病愈

換皮散 治肺臟風毒遍身瘡疥及癮疹瘙痒成瘡面上風刺粉

刺　　樺皮肆兩燒灰并荊芥穗貳兩
杏仁貳兩去皮尖用水一椀於銀器內
熬去水壹半已來放令乾用
炙甘草半兩　　枳殼肆兩去瓤後用炭火燒
欲灰於溫席上令乾

右件除杏仁外餘藥爲末將杏子另研與諸藥和勻磁合內
放之每服二錢食後溫水調下

聖散治大風癩疾將皂角刺一二斤燒灰研細煎大黃半兩
調下二錢早服樺皮散中煎升麻湯下瀉青丸晚服二聖散
此數等之藥皆爲緩疎泄血中之風熱也
七聖丸七宣丸皆治風壅邪熱潤利大腸中風風癩癘風大
便秘澁皆可服之

破傷風證

夫風者百病之始也清淨則湊理閉拒雖有大風奇毒弗能爲

害故破傷風者通於表裏分別陰陽同傷寒證治人知有發表不知有攻裏和解此汗下和三法也諸瘡不差榮衛虛肌肉不生瘡眼不合者風邪亦能外入於瘡爲破傷風之候諸瘡上炙及瘡着白痂瘡口閉塞氣難通泄故陽熱易爲鬱結熱甚則生風也故表脉浮而無力太陽也在表宜汗脉長而有力陽明也在裏宜下脉浮而弦小者少陽也半在表半在裏宜和解若明此三法而治不中病者未之有也

羌活防風湯 治破傷風邪初傳在表

羌活　防風　川芎　蒿本　當歸
芍藥　甘草各肆兩　地榆　細辛各貳兩

右㕮咀每服五錢水煎量緊慢加減用之熱則加大黃三兩大便秘則加大黃一兩緩緩令過熱甚更加黃芩二兩

白朮防風湯 若服前藥過有自汗者

白朮　黃耆各一兩　防風二兩

右㕮咀每服五七錢水煎

破傷風藏府秘小便赤用熱藥自汗不休故知無寒也宜速下之先用芎黃湯三二服後用大芎黃湯下之

芎黃湯

川芎一兩　黃芩六分　甘草二分

右㕮咀水煎

大芎黃湯

川芎伍分　羌活　黃芩　大黃各一兩

右㕮咀水煎

羌活湯 治半在表半在裏

羌活　菊花　麻黃　川芎　白茯苓

防風　石膏　前胡　黃芩　蔓荊子

細辛　甘草　枳殼已上各一兩　薄荷　白芷各半兩

右㕮咀生姜同煎日二

防風湯治破傷風同傷寒表證未傳入裏宜急服此藥

防風　羌活　獨活　川芎各等分

右㕮咀水煎服後宜調蜈蚣散大効

蜈蚣散

蜈蚣一對　鰾伍分　左盤龍伍分炒烟盡用

右為細末用防風湯調下如前藥解表不已兼直轉入裏當服左龍丸服之漸漸看大便硬軟加巴豆霜

左龍丸治直視在裏者

左盤龍五分炒　白殭蠶五分炒　鰾伍分炒　雄黃一分研

右同為細末燒飯為丸桐子大每服十五丸溫酒下如裏證不已當於左龍丸內一半末加入巴豆霜半錢燒飯為丸桐

子大同左龍丸一劑每服加一丸漸加服至利爲度若利後更服後藥若搐搦不已亦宜服後藥羌活湯也

羌活湯　羌活　獨活　地榆　防風各一兩

右㕮咀水煎如有熱加黃芩有涎加半夏若病日久氣血漸虛邪氣入胃全氣養血爲度

養血當歸地黃湯　當歸　地黃　芍藥　川芎　藁本　防風　白芷各一兩　細辛伍分

右爲麄末水煎

頭風證

肝經風盛末自搖動梳頭有雪皮乃肺之證也謂肺主皮毛實則泄青丸主之虛則消風散主之

雷頭風證

夫雷頭風者震卦主之諸藥不効為與證不相對也

升麻湯 一兩　蒼朮 一兩　荷葉 全一个

右為細末每服五錢水煎或燒荷葉一个研細用前藥調服亦可

胎產證

婦人童幼至天癸未行之間皆屬少陰天癸既行皆從厥陰論之天癸已絕乃屬太陰經也治胎產之病從厥陰經無犯胃氣及上二焦為之三禁不可汗不可下不可利小便發汗者同傷寒下早之證利大便則脉數而已動於脾利小便則內亡津液胃中枯燥製藥之法能不犯三禁則榮衛自和而寒熱止矣如發渴而白虎氣弱則黃耆血刺痛而用以當歸腹中疼而加之芍藥大抵產病天行從增損柴胡雜證從增損

四物宜詳察脉證而用之

產前寒熱小柴胡湯中去半夏謂之黃龍湯

二黃散 治婦人有孕胎漏

生地黃　熟地黃各等分

右爲細末煎白朮杜殼湯調下

半夏湯 治胎衣不下或子死腹中或子衝上而昏悶或血暴下及胎乾不能產者

半夏麴一兩半　桂七分半　桃仁三十八個炒去皮尖　大黃伍分

右爲細末先服四物湯二兩服次服半夏湯生姜同煎

猪膚柴胡湯 治產後經水適斷感於異證手足搐搦咬牙唇冒繫屬上焦

柴胡八分　黃芩四分半　人參三分　甘草四分炒　石膏四分

知母二分 黃耆伍分 半夏二分

右爲麤末每服半兩生姜棗同煎

秦艽湯 前證已去次服此以去其風邪

秦艽八分 芍藥半兩 柴胡八分 防風 黃芩各四分半

人參 半夏各二分 炙甘草四分

右爲麤末水煎

荊芥散 二三日後經水復行前證俱退宜此

小柴胡湯一料加荊芥穗五錢 枳殼麩炒去穰伍分

右爲麤末同小柴胡煎法

防風湯 三二日後宜正脾胃之氣兼除風邪

蒼朮四兩 防風三兩 當歸一兩 羌活一兩半

右爲麤末水煎

三分散 治產後日久虛勞針灸小藥俱不效者

川芎　熟地黃　當歸　芍藥　白朮
茯苓　黃耆 已上各一兩　柴胡　人參 各一兩二分
黃芩　半夏　甘草 各六分

右爲麁末水煎服清

血風湯 治產諸風痿拳無力　秦艽　羌活
防風　白芷　川芎　芍藥　當歸
地黃　白朮　茯苓 各等分　加半夏　黃耆

右爲細末一半爲丸煉蜜如桐子大一半爲散溫酒調下丸藥五七十丸

治血運血結或聚於胸中或偏於少腹或運於脇肋四物湯四兩倍當歸川芎鬼箭紅花玄胡各一兩同爲麁末如四物煎

服清調

沒藥散服之

蚵蚾去羽足一分微炒　水蛭二分炒　麝香少許　沒藥一分

右為細末煎前藥調服血下痛止只服前藥

加減四服湯治產後頭痛血虛氣弱痰癖寒熱皆令頭痛

羌活　川芎　防風　香附子炒各壹兩　細辛壹兩半

炙甘草　當歸各伍分　石膏二兩半　熟地黃一兩　香白芷一兩半

蒼朮一兩六分去皮

右為麤末每服一兩水煎

如有汗者是氣弱頭痛也前方中加芍藥三兩桂一兩半生姜煎

如頭痛發癖者加半夏三兩茯苓一兩半生姜煎

如熱厥頭痛加白芷三兩石膏二兩知母一兩半
如寒厥頭痛加天麻三兩附子一兩半生姜煎

四物湯 治諸變證　方已載元戎方中

紅花散 治婦人產後血昏血崩月事不調遠年乾血氣皆治之

乾荷葉　牡丹皮　當歸　紅花　蒲黃 炒各等分

右為細末每服半兩酒煎和滓溫服
如衣不下別末榆白皮煎湯調下半兩立效

當歸散 治婦人惡物不下

當歸　芫花 炒　右為細末酒調二錢

又一方好黑醋淬末之小便酒調下
治胎衣不下蛇退皮炒焦細末酒調下如胎衣在腹另碾榆白皮末同煎服立下

生地黃散 諸見血無寒衄血下血吐血溺血皆屬於熱

生地黃　熟地黃　枸杞子　地骨皮　天門冬
黃耆　芍藥　甘草　黃芩已上各等分

右為麤末每服一兩水煎脉微身凉惡風每一兩加桂半錢

麥門冬飲子 治衄血不止

麥門冬　生地黃各等分

右剉每服一兩水煎　又衄血先朱砂蛤粉　次木香黃連
大便結下之大黃芒硝甘草生地黃
溏軟梔子黃芩黃連可選而用之

帶下證

赤者熱入小腸白者熱入大腸其本濕熱寃結于脉不散故為
赤白帶下也寃屈也結也屈滯而病熱不散先以十棗湯下

之後服苦練九大玄胡散調下之熱去濕除病自愈也
月事不來先服降心火之劑後服局方中五補丸後以衛生
湯治脾養血氣可也

苦練丸 治赤白帶下

苦練 碎酒浸 茴香 炒 當歸 各等分

右為細末酒糊丸如桐子大每服五十丸空心酒下

衛生湯 白芍藥 當歸各二兩 黃耆 三兩 甘草 一兩

右為麤末水煎空心 如虛者加人參一兩

大頭風證

夫大頭風證者是陽明邪熱太甚實少陽相火而為之也多
在少陽或在陽明或在太陽視其腫勢在何部分隨經取之
濕熱為腫木盛為痛此邪見於頭多在前後先出治之大不

宜藥速速則過其病所謂上熱未除中寒復生必傷人命此病是自外而之內者是血病況頭部分受邪見於無形迹之部當先緩而後急先緩者謂邪氣在上着無形之部分既着無形無所不至若用重劑速下過其病難已雖無緩藥若急服之或食前或頓服皆失緩躰則藥不能得除病當徐徐浸漬無形之邪也或藥性味形躰拟象皆要不離緩躰是也且後急者謂緩劑已漓邪氣入於中是到陰部染於有形質之所若不速去則損陰也此終治却為客邪當急去之是治客以急也　且治王當緩者謂陽邪在上陰邪在下若急治之不能解紛而益乱也　治客以急者謂陽分受陰邪陰分受陽邪此客氣急除去之也

假令少陽陽明為病少陽為邪出於耳前後也陽明為邪者

首大腫也先以黃芩黃連甘草湯通炒過對煎少少不住服或劑畢再用煨黍粘子新瓦上炒香同大黃煎成去滓內芒硝俱各等分亦時時呷之無令飲食在前得微利及邪氣已只服前藥如不已再同前次第服之取大便利邪氣則止如陽明渴者加石膏　如少陽渴者加茈葳根

陽明行經升麻芍藥葛根甘草

太陽行經羌活防風之類

黑白散　治大頭風如神　方在後家珠內　消毒丸　在宝鑑內附

癚證

夏傷於暑秋必病癚蓋傷而淺者近而暴傷之重者遠而疾癚癚者久癚也是知夏傷於暑溫熱閉藏而不能發泄于外邪氣內行至秋而發為癚也何經受之隨其動而取之有中三

陽者有中二陰者經中邪氣其證各殊同傷寒論之也五藏皆有瘧其治各異在太陽經謂之風瘧治多汗之在陽明經謂之熱瘧治多下之在少陽經謂之風熱瘧治多和之在陰經則不分三經揔謂之濕瘧當從大陰經論之

治瘧疾發暑前發頭痛項強脉浮惡寒有汗桂枝羌活湯

桂枝　羌活　防風　甘草各半兩

右為麤末水煎　如吐者加半夏麴等分

治瘧病頭痛項強脉浮惡風無汗者麻黃羌活湯

麻黃去節　羌活　防風　甘草各半兩

右為麤末水煎　如吐者加半夏麴等分

治發瘧如前證而夜發者麻黃桂枝湯

麻黃一兩去節　炙甘草二分　黃芩伍分　桂二分　桃仁二十枚去皮尖

右為末水煎桃仁散血緩肝夜發乃陰經有邪此湯散血中風寒也

治瘧服藥寒熱轉大者知太陽陽明少陽三陽合病也宜桂枝黃芩湯和之

桂枝 甘草 黃芩 人參 各四分半 半夏 四分 柴胡 一兩 二分 石膏 知母 各伍分 桂枝 二分

右為麁末水煎

從卯至午時發者宜大柴胡湯下之

從午至酉發者知其邪氣在內也宜大承氣湯下之

從酉至子時發者或至寅時者知其邪氣在血也宜桃仁承氣湯下之微利後更以小柴胡湯制其邪氣可也

熱證

有表而熱者謂之表熱無表而熱者謂之裏熱有暴發而為熱

者乃久不宣通而致也有服温藥而為熱者有惡寒戰慄而熱者蓋諸熱之屬心火之象也治法小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之甚熱之氣則汗發之發之不尽則逆制之制之不尽求其屬以衰之苦者以治五藏五藏屬陰而居於内辛者以治六府六府屬陽而在於外故内者下之外者發之又宜養血益陰其熱自愈

地黄丸 方在前發明内附

如煩渴發熱虚煩蒸病空心服地黄丸食後服 防風當歸飲子

柴胡 人參 黄芩 甘草各一兩 滑石二兩
大黄 當歸 芍藥各半兩 防風半兩

右為麤末生姜同煎 如痰實咳嗽加半夏

金花丸 治大便黄米穀完出驚悸溺血淋閉瘀血衄血自汗頭

痛積熱肺痿

黃連　黃蘗　黃芩　山梔子仁各一兩

右為細末滴水為丸桐子大溫水下

如大便結實加大黃自利不用大黃

如中外有熱者作散對服名解毒湯

如腹滿嘔吐欲作利者解毒湯內加半夏茯苓厚朴各三錢生姜同煎　如白膿下痢後重者加大黃三錢

涼膈散　方在難知內附　加減于后

若咽嗌不利腫痛并涎嗽者加桔梗一兩荊芥穗半兩

若欬而嘔者加半夏半兩生姜煎

若鼻衄嘔血者加當歸芍藥生地黃各半兩

若淋閉者加滑石四兩茯苓一兩

當歸承氣湯 治熱攻於上不利於下陽狂奔走罵詈不避親疎

大黃　當歸各一兩　甘草半兩　芒硝玖分

右㕮咀生姜棗同煎

牛黃膏 治熱入血室發狂不認人者

牛黃一分半　朱砂　蔚金各三分　腦子　甘草各一分

牡丹皮二分

右為細末煉蜜為丸如皂子大新水化下

治表熱惡寒而渴陽明證白虎湯也

若膚如火燎而熱以手取之不甚熱為肺熱也目睛赤煩燥或引飲獨蔘一味主之

若兩脇下肌熱脉浮弦者柴胡飲子主之

若脇肋熱或一身盡熱者或日晡肌熱者皆為血熱也四順

飲子主之

若夜發熱主行陰乃血熱也四順飲子桃仁承氣選而用之

若晝則明了夜則譫語四順飲子證

若發熱雖無脇熱亦為柴胡證

晝則行陽二十五度氣藥也大抵則柴胡飲子

夜則行陰二十五度血藥也大抵則四順飲子

眼證

眼之為病在府則為表當除風散熱在藏則為裏宜養血安神

暴發者為表而易治久病者在裏而難愈除風散熱者瀉青

丸主之養血安神者定志丸婦人則熟乾地黃丸主之

治眼暴赤暴腫散熱飲子

防風　羌活　黃芩　黃連　已上各一兩

右㕮咀水煎食後溫服
如大便秘澁加大黃一兩
如痛甚者加當歸地黃各一兩
如煩燥不得眠睡加梔子一兩

地黃湯 治眼久病昏澁因發而久不愈者
防風 羌活 黃芩 黃連 地黃
當歸 人參 茯苓 已上各等分
右爲麤末水煎

四物龍膽湯 治目暴發 方在元戎四物湯條下附

點眼藥則有碧雲膏 方在後冊雜方內附
洗眼藥則有夜光丹 方在宝鑑內附 嗑藥在後雜方內附
消渴證

消渴之疾二焦受病也有上消有消中有消腎上消者肺也多飲水而少食大便如常小便清利知其燥在上焦也治宜流濕以潤其燥

消中者胃也渴而飲食多小便赤黃熱能消穀知其熱在中焦也宜下之

消腎者初發為膏淋謂淋下如膏油之狀至病成而面色黧黑形瘦而耳焦小便濁而有脂液治法宜養血以肅清分其清濁而自愈也

黃連青

黃連末壹斤生地黃自然汁白蓮花藕汁牛乳汁各壹斤右將汁熬成膏子剤黃連末為丸桐子大每服二十丸少呷溫水送下日進十服渴病立止

八味丸 治消腎方在發明內附

腫脹證

五臟六腑皆有脹經云平治權衡去宛陳莝開鬼門潔淨府平治權衡者察脉之浮沉也去宛陳莝者疎滌腸胃也開鬼門者發汗也潔淨府者利小便也蠱脹之病治以鷄屎醴酒調服水脹之病當開鬼門決潔淨府也

治水腫蠭蛄去頭足與葡萄心同研露七日曝乾為末淡酒調下暑月用佳

又方棗一斗鍋內入水上有四指用大戟并根苗蓋之煑盆合之煑熟為度去大戟不用旋旋喫無時盡棗決愈神効

瘡瘍證

瘡瘍者火之為須分內外以治其本若其脉沉實當先疎其內

以絕其源也其脉浮大當先托裏恐邪氣入內也有內外之中者邪氣至盛遏絕經絡故發癰腫此因失托裏及失疎通又失和榮衛也治瘡之大要須明托裏疎通行榮衛之三法內之外者其脉沉實發熱煩躁外無瘍赤痛深於內其邪氣深矣故先疎通臟腑以絕其源外之內者其脉浮數瘍腫在外形證外顯恐邪氣極而內行故先托裏也內外之中者外無瘍惡之氣內亦臟腑宣通知其在經當和榮衛也用此三法之後雖未差必無變證亦可使邪氣峻減而易痊愈

內疎黃連湯 治嘔噦心逆發熱而煩脉沉而實腫硬木閉而皮肉不變色根繫深大病遠在內臟腑秘澁當急疎利之

黃連　山梔子　芍藥　當歸　檳榔
木香　薄荷　連翹　黃芩　桔梗

甘草 已上各一兩

右為末水煎先喫一二服次後加大黃一錢再服加二錢以利為度

如有熱證止服黃連湯大便秘澁則加大黃

如無熱證煎後藥復煎散時時服之如無熱證及大便不秘澁止服復煎散稍有熱證却服黃連湯秘則加大黃如此內外皆通榮衛和調則經絡自不遏絕矣

內托復煎散 治腫瘍於外根槃不深形證在表其脉多浮痛在皮肉邪氣盛而必侵於內須急內托以救其裏也

地骨皮 黃耆 防風 各二兩 芍藥 黃芩 白朮 茯苓 人參 甘草 當歸 防己 已上各一兩 柳桂淡味加伍分

右�once咀先煎蒼朮一斤用水五升煎至三升去蒼朮滓入前藥十二味再煎至三四盞絞取清汁作三四服終日服之又煎蒼朮滓為湯去滓再依前煎十二味藥滓服之此除濕散鬱熱使胃氣和平如或未已再作半料服之若大便秘及煩熱少服黃連湯如微利煩熱已退却服復煎散半料如此使榮衛俱行邪氣不能自侵也

當歸黃耆湯 治瘡瘍藏腑已行如痛不可忍者

當歸　黃耆　地黃　川芎　地骨皮

�once為粗末每服五錢水一盞半煎至八分去滓空心溫服

右�once咀水煎　如發熱加黃芩　如煩燥不能睡臥者加梔子　如嘔則是濕氣侵胃倍加白朮

內消升麻湯 右治血氣壯實若患癰疽大小便不通

升麻　大黃各二兩　黃芩一兩半　枳實麩炒　當歸
芍藥各一兩半　炙甘草一兩

右㕮咀水煎食前

復元通氣散 治諸氣澀耳聾腹癰便癰瘡疽無頭止痛消腫

青皮　陳皮各四兩　甘草三兩生熟各半　川山甲炮
括蔞根各二兩　加金銀花一兩　連翹一兩

右爲細末熟酒調下

五香湯 治毒氣入腹托裏若有異證於內加減

丁香　木香　沉香　乳香各一兩　麝香二分

右爲細末水煎空心

嘔者去麝加藿香葉一兩　渴者加人參一兩

赤芍藥散 治一切丁瘡疽癰初瘍增寒疼痛

金銀花　赤芍藥各半兩　大黃七分半　皂莢大者一枚
當歸　甘草　枳實各二分
右爲麤末水酒各半煎

桃紅散 斂瘡生肌定血辟風邪
滑石四兩　乳香　輕粉各一分　小豆粉一分　寒水石燒三兩
一方改小豆粉爲定粉一兩
右爲極細末乾貼

冰霜散 治火燒皮爛大痛
寒水石生　牡礪燒　朴硝　青黛各一兩　輕粉一分
右爲細末新水或油調塗立止

乳香散 治杖瘡神效
乳香　沒藥各二分　黃蜀葵四分　自然銅半兩火燒醋蘸十遍　當歸半兩

右為細末每服五錢温酒調下

五黃散 治杖痛定痛

黃丹　黃連　黃芩　黃檗　大黃

乳香已上各等分

右為細末新水調成膏用絹絹帛上攤貼

花蘂石散 治一切金瘡犬狗咬傷婦人敗血惡血奔心血運胎死胎衣不下至死者以童子小便調下一錢取下惡物神効

硫黃 明淨者四兩　花蘂石一斤

右二味拌勻用紙筋和膠泥固濟瓦罐子一个入藥內密泥封口了焙乾安在四方墩上 墩上書八卦五行字 用炭一秤圍燒自巳午時從下生火直至經宿火盡又經宿觀冷取研極細磁盒內盛

截痛散 治牢深疼瘭瘡

黃連半兩　白斂　白芨　丹各一兩　輕粉一分
龍腦　麝香各半分另研　蜜陀僧一兩

右為細末和勻乾糝或紙上以膏貼之

生肌散

寒水石　對滑石各一兩　烏魚骨　龍骨各一兩
定粉　蜜陀僧　白鑞灰　乾烟脂各半兩

右為極細末乾糝用之

平肌散 治諸瘡久不斂

蜜陀僧　花藥石　二物同煅赤　白龍骨各一兩
乳香另研　輕粉各一分　黃丹　黃連各二分半

右為極細末和勻乾糝

雷霆挺子 治惡瘡透了不覺疼痛者

銅綠壹兩　硇砂貳分　蟾酥壹分

右爲細末燒飯和作麥糕挺子每用刺不覺痛者須刺血出方紙藥在內以膏貼之

用藥加減

如發背丁腫膿潰前後虛而頭痛於托裏藥內加五味子

恍惚不寧加人參茯神　虛而發熱者加地黃括蔞根

潮熱者加柴胡地骨皮　渴不止者加知母赤小豆

虛煩者加枸杞天門冬　自利者加厚朴

膿多者加當歸川芎　痛甚者加芍藥乳香

肌肉遲生者加白斂官桂　有風邪者加獨活防風

心驚悸者加丹砂　口目瞤動者加羌活細辛

嘔逆者加丁香藿葉　痰多者加半夏陳皮

回瘡金銀花散 治瘡瘍痛甚則色變紫黑者

金銀花連枝葉剉貳兩　黃耆肆兩　甘草壹兩

右㕮咀用酒一升同入壺瓶內閉口重湯內煮二兩時辰取出去滓頓服之

雄黃散 治瘡有惡肉不能去者

雄黃壹分研　巴豆不去皮研壹个去皮半分

右二味再同研如泥入乳香沒藥各少許再研勻細少上惡肉自去矣

瘰癧證

夫瘰癧者結核是也或在耳後或在耳前或在耳下連及頤頷或在頸下連缺盆皆謂之瘰癧或在脅及脅之側或在兩脇皆謂之馬刀手足少陽主之

治結核前後耳有之或耳下頷下有之皆瘰癧也桑椹二斗極熟黑色者以布裂取自然汁不犯銅鐵以文武火慢熬作薄膏子每日白沸湯點一匙食後日三服

治馬刀連翹湯

連翹　瞿麥花各壹斤　大黃叁兩　甘草貳兩

右咬咀水煎服後十餘日可於臨泣穴灸二七壯服五六十日方効在他經者又一方加大黃木通五兩知一作母五兩雄黃七分檳榔半兩減甘草不用同前藥為細末熟水調下三五錢服之

癭瘿歌子

連翹壹斤　瞿麥穗半斤

右為麁末水煎臨卧服此藥經効多不能連驗宜待歲月之久除也

咳嗽證

咳謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而為痰也咳嗽是有痰而有聲蓋因傷於肺氣而效動於脾濕因效而為嗽也治效嗽者治痰為先治痰者下氣為上是以南星半夏勝其痰而咳嗽自愈也枳殼陳皮利其氣而痰自下也痰而能食者大承氣湯微下之痰而不能食者厚朴湯治之夏月嗽而發熱者謂之熱痰嗽小柴胡湯四兩加石膏一兩知母半兩用之冬月嗽而發寒熱謂之寒嗽小青龍加杏仁服之蜜煎生姜湯蜜煎橘皮湯燒生姜胡桃皆治無痰而嗽者此乃大例更當隨時隨證加減之

利膈丸 方在寶鑑內附

理氣丸 治久嗽痰喘肺氣浮腫

郁李仁　青皮去白陳皮去白檳榔　木香
杏仁去皮尖馬兜苓炒人參　廣茂　當歸
澤瀉　茯苓　苦葶藶炒各貳分　防己伍分
牽牛取頭末壹兩半

右為細末生姜汁麵糊為丸桐子大生姜湯下
治咳嗽諸方在家珍內并寶鑑內者更宜選而用之

虛損證

虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則增陽陽虛則陰盛故損則自上而下治之宜以辛甘淡過於胃則不可治也感熱則損陰陰虛則陽盛故損則自下而上治之宜以苦酸鹹過於脾則不可治也自上而損者一損於肺故皮聚而毛落二損損於心故血脉虛弱不能榮於臟腑婦人則月水不通三損損

於胃故飲食不爲肌膚也自下而損者一損損於腎故骨痿不能起於床二損損於肝故筋緩不能自收持三損損於脾故飲食不能消磨也故心肺損則色變肝腎損則形瘦脾胃損則穀不化也

治肺損皮聚而毛落宜益氣（四君子湯）方在前難知內附

治心肺虛損皮聚而毛落血脈虛損婦人月水愆期宜益氣和血（八物湯）方在前元戎內附

治心肺損及胃損飲食不爲肌膚宜益氣和血調飲食（十全散）方在前元戎內附

治腎肝損骨痿不能起于床宜益精筋緩不能自收持宜緩中

（牛膝丸）

牛膝酒浸 萆薢 杜仲劉炒 菟絲子酒浸 鬼臼

防風　葫芦巴炒　桂減半　破故紙　沙苑白蒺藜

右等分爲細末酒煮豬腰子爲丸每服五七十丸空心温酒下如腰痛不起者服之甚効

治陽盛陰虛肝腎不足房室虛損形瘦無力面多青黄而無常色宜榮血養腎地黄丸

蒼木壹斤泔浸　熟地黄壹斤　乾姜春柒分秋柒分　夏半兩冬壹兩

右爲細末煮棗肉爲丸桐子大每服五七十丸至百丸諸飲下若加五味子爲腎氣丸述類象形神品藥也

如陽盛陰虛心肺不足及男子婦人面無血色食少嗜卧肢躰困倦宜八味丸方在元戎内附

如形躰瘦弱無力多困未知陰陽先損夏月宜地黄丸春秋宜腎氣丸冬月宜八味丸

治病久虛弱厭厭不能食（和中丸）方在前脾胃論中

吐證

吐證有二氣積寒也皆從二焦論之上焦在胃口上通於天氣主內而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣主腐熟水穀下焦在臍下通於地氣主出而不納是故上焦吐者皆從於氣氣者天之陽也其脉浮而洪其證食已暴吐渴欲飲水大便結燥氣上衝而胃發痛其治當降氣和中中焦吐者皆從於積有陰有陽食與氣相假爲積而痛其脉浮而匿其證或先痛而後吐或先吐而後痛治法當以小毒藥去其積積榔木香和其氣下焦吐者皆從於寒地道也其脉沉而遲其證朝食暮吐暮食朝吐小便清利大便秘而不通治法當以毒藥通其秘寒溫其寒氣大便漸通復以中焦藥和之不令大

便秘結而自愈也

治上焦氣熱上衝食已暴吐脉浮而洪宜先和中（枳實梗湯）

枳實（麩炒）厚朴（姜製炒香）各壹兩　白朮各壹兩半　半夏麴貳兩　陳皮（去白）白茯苓

右㕮咀水煎取清調木香散二錢隔夜空腹服之後氣斷下吐斷止然後去木香散加芍藥二兩薑壹兩半每一料中加減算加之

如大便燥結食不盡下以大承氣湯去硝微下之少利再服前藥補之

如大便復結依前再微下之

（木香散）　木香　檳榔各等分

右為細末前藥調服

厚朴九 主飜胃吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸疾其藥味即與萬病紫苑丸同方在元戎方內附 其加減于后

春夏再加黃連貳兩 秋冬再加厚朴貳兩

如治風於春秋所加黃連厚朴外更加菖蒲茯苓各一兩半

如治風癇不愈者依春秋加減外更加人參菖蒲茯苓各一兩半 如失精者加菖蒲白茯苓爲輔

如肝之積加柴胡蜀椒爲輔

如心之積加黃連人參爲輔

如脾之積加吳茱萸乾薑爲輔

如腎之積加菖蒲茯苓爲輔 秋冬久瀉不止加黃連茯苓

心痛證

諸心痛者皆少陰厥陰氣上衝也有熱厥心痛者身熱足寒痛

甚則煩燥而吐額自汗出知為熱也其脉浮大而洪當灸大椎及崑崙謂表裏俱瀉之是謂熱病汗不出引熱下行表汗通身而出者愈也炙畢服金鈴子散則愈痛止服枳术丸去其餘邪也有大實心中痛者因氣而食卒然發痛大便或秘久而注悶心胷高起按之愈痛不能飲食急以煮黃丸利之利後以養本湯去其邪也有寒厥心痛者手足逆而通身冷汗出便溺清利或大便利而不渴氣微力弱急以术附湯温之寒厥暴痛非久病也朝發暮死急當救之是知久病無寒暴病非熱也

金鈴子散 治熱厥心痛或發或止久不愈者

金鈴子　玄胡各壹兩

右為細末每服二三錢酒調下温湯亦得

治大實心痛二藥

厚朴丸同紫苑丸在元戎方內　煮黃丸方在陰證略例內

治大實心痛大便已利宜藁本湯止其痛也

藁本半兩　蒼术壹兩

右爲麄末水煎服清

治寒厥暴痛脉微氣弱宜茱附湯溫之方在雲岐脉論內附

疝證

男子七疝婦人瘕聚帶下皆任脉所主陰經也腎肝受病治法同歸於一

酒煮當歸丸

當歸劉　附子炮　苦練子劉　茴香各壹兩

右劉以酒二升同煮酒尽爲度焙乾作細末入

丁香　木香各貳分　全蝎貳拾貳个　玄胡貳兩

右同為細末與前藥一處拌勻酒糊為丸每服三五十丸至百丸空心温酒下凡疝氣帶下皆屬於風全蝎治風之聖藥茴香苦練皆入小腸故以附子佐之丁香木香則導為用也治奔豚及小腹痛不可忍者（苦練丸）

苦練　茴香各壹兩　黑附子壹兩炮去皮臍

右用酒二升煮酒盡為度曝乾或陰乾搗為極細末每一兩藥末入　全蝎拾捌个　玄胡伍分　丁香拾伍个

右共為細末酒糊為丸桐子大每服百丸空心酒下如痛甚煎當歸入酒下大効

活法機要 畢

單疴怪

朱元亨著

本館據夷門廣牘
本影印初編各叢
書僅有此本

怪疴單

怪疴單

元 朱丹溪 著
明 周履靖 梓

治人鼻中毛出晝夜長一二尺漸漸粗圓如繩痛不可忍摘去更生此因食猪羊血過多而然也用磠砂乳香飯爲丸水下十粒早晚各一服病去乃止

一人忽覺自形作兩人並卧不別真假不語問亦無對乃離魂也用硃砂人參茯苓濃煎服

真者氣爽而假者即化

治遍身忽然肉出如錐痒痛不能飲食名血癰用赤皮葱燒灰水淋汁洗內服淡豆豉湯數盞即愈

治人眼前常見禽蟲飛去捉之即無乃肝膽經爲疾用酸棗仁羌活玄明粉青箱子各一兩爲末每水煎二錢和滓服日三服

治人眼珠垂下至鼻大便血出名肝脹用羌活水煎數服即愈

治人腹中有物作聲隨人語言名應聲蟲服雷丸即愈

一人飲油五升方始快意乃髮入胃血裹化爲蟲也用雄黃五錢水調服

治人腹中有虫如蟹走於皮下作聲如兒啼爲筋肉之化用雷丸雄黃等分爲末摻猪肉上炙而食之即愈

一人因着艾炙訖火痂便落瘡內鮮血片片如胡蝶樣騰空飛去痛不可忍此是血肉俱熱

用大黃芒硝等分爲末水調下微利即愈

一人臨卧忽渾身虱出約五升血肉俱壞而舌尖血出不止用鹽醋湯飲十數次即愈

治人眼赤鼻張大喘渾身出斑髮如銅鐵絲硬乃目中熱毒氣結於下焦用白凡滑石各一兩水三碗煎至一碗半不住口飲盡乃效

一人卧於床四肢不能動只進得食好大言說喫物謂之失說物望病如說某物即以其肉與看不與食之失他物望也睡中流出饞唾

病即愈

治人手十指斷壞唯有筋連無節肉內虫出如燈心長數寸遍身綠毛名血餘用茯苓胡黃連煎服愈

一人遍身皮底渾渾如波浪聲痒不可忍抓之血出不能止名氣奔用人參苦杖青塩細辛各一兩水二碗煎十數沸飲盡便愈

治眼內白睛俱黑見物依舊毛髮直如鉄條不語如醉名血潰用五靈脂酒調下二錢愈

治人口鼻中氣出盤旋不散凝似黑盖過十日漸漸至肩與肉相連堅勝鉄石無由飲食多因瘧後得之用澤蘭水煎日飲三盞五日愈

治頭面發熱有光色他人手近如火炙用蒜汁半兩酒調下吐物如蛇遂安

一人渾身生泡如甘棠梨破則出水內有石一片如指甲大其泡復生抽盡肌肉不可治矣

急用三稜莪朮各五兩爲末分三服酒調下

治夜有醉者口渴誤吞水蛭腹痛黃瘦不進飲

食用小死魚三四箇猪脂煎鎔攪勻入巴豆十粒碎爛和田中乾泥丸如菉豆大以田中冷水吞下一丸泄下爲度

治人忽然氣上喘不能語口中涎流吐逆齒皆搖動氣出轉大即悶絶名傷寒併熱霍亂用大黄人參各五錢水三盞煎一盞服

一人口内生肉毬有根線長五寸餘吐毬出方可飲食以手輕捏痛徹於心水調生射香一錢頻頻服之三日根化而愈

治人手足甲忽然長倒生肉刺如錐食葵菜自愈

治人面上及遍身生瘡似猫兒眼有光彩無膿血冬則近脛名白寒瘡多食魚雞菉韭即愈

治人脊破腸出臭穢急以香油抹腸送入即不出又以人參枸杞子煎湯淋之皮自合喫猪腎粥十日愈

一人小便中出屎大便出尿名交腸用舊幞頭燒灰酒下五分愈

治玉莖硬不痿精流無歇時如針刺捏之則脆乃爲腎漏疾用韭子破故紙各一兩爲末每三錢水煎日三服即止

一人身及頭面肉腫如蛇狀用雨濕磚上青苔一錢水調塗立消

治人大腸內虫出不斷斷之復生行坐不得用鶴虱末水調服五錢自愈

治蛟龍瘕用寒食飯三升每食五合日三服吐出蛟龍而愈

治鼻腥臭水流以碗盛而視之有如鉄色蝦魚如米大走躍捉之即化爲水此肉壞矣食雞肉一日二次不過一月而愈

治兩足心凸如腫硬如釘脛骨生辟孔流髓身發寒戰惟思飲酒此肝腎氣冷熱相吞用川烏炮爲末付之內煎韭菜湯服之愈

治四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解用黃蘆酒浸一宿焙乾爲末酒調下二錢多服即安

一人咽喉間生肉層層相疊漸漸腫起有竅出臭氣用臭橘葉煎服愈

有小兒身上發瘡初生如魚胞又如水晶碎則水流用蜜陀僧羅極細摻之

一兒初生遍身無皮俱是赤肉掘土坑卧一宿即長皮又方白早米粉乾撲於上候生皮乃止

治人項上生瘡如櫻桃有五色瘡破即項皮斷逐日飲牛乳自消

治人寒熱不止四肢如石擊之如鐘聲日漸消瘦用茱萸木香等分水煎一二服即愈

一人大腸頭出寸餘候乾自退落又名截腸病用芝麻油器盛坐之飲大麻子汁數升愈

治人腹中如鉄石臍中水出旋變作虫行之狀遶身匝皮痒痛不忍扒掃不盡濃煎蒼术浴之又以蒼术加麝香水調服之

一人眉毛搖動目不能視喚之不應但能飲食用蒜三兩取汁酒調下即愈

一人毛竅節次血出少間不出即皮脹如皷口鼻眼目俱脹合名脉溢用生姜汁并水各一二盞服之即安

人面瘡　昔人患此于臂上滴酒瘡口中即面赤與物食之即肉脹獨以貝母付之則斂眉閉口若有苦楚之狀乃煎貝母湯以葦筒灌之数日成甲而愈

一婦人年二十餘腮生一竅口中所欬膿血與竅相應而出此肺瘘也用人參黃芪當歸加

退熱排膿之劑而愈

治患蛇癥乃蛇精及液沾菜上人悞食之腹內成蛇或食蛇亦有此証其人常飢食之即吐用赤頭蜈蚣一條炙爲末分二服酒下

鼈癥痛有未止或食鼈即痛用雞屎一升炒黃投酒中浸一宿焙爲末元浸酒調下

雞癥有病冷痰者醫曰因食白淪雞過多故也用蒜一枚煮服乃吐一物如升大痰裹開視之乃雞雛也再服吐十三雛而愈

治婦產後有傷胞破不能小便常漏濕不乾用生絲絹一尺剪碎白牡丹根炒白芨各末一錢水一碗煎至絹爛如餳空心頓服不得作聲作聲即不効

一人心漏當胷數竅血液常流二十年用鹿茸酥炙附子炮塩花棗肉爲丸每酒下三十丸半月而愈

治婦人產後忽兩乳細小下垂過小腹痛甚名乳懸用川芎當歸各二斤內用半斤水煎服

餘用燒烟熏口鼻二料乃効

一婦産後水道中出肉線一條長三四尺動之則痛欲絶先服失笑散數服次以帶皮姜三斤研爛入清油二斤煎油乾爲度用綃兜起肉線屈曲于水道邊以前姜燻之冷則熨之一日夜縮其大半二日即盡入再服失笑散芎歸湯調理之如肉線斷則不可治矣

治人手指攣曲節間疼不可忍漸至斷落以革麻子去殼二兩碎者不用黃連四兩貯瓶内

水二升浸之春夏三日秋冬五日每早面東以此水吞下蕳麻子一粒漸加至四五粒微泄無害忌食動風物屢驗

一人傷寒舌出寸餘連日不收用梅花腦摻舌上應手而收重者用五錢方愈

張子和治一婦人木舌脹滿口諸藥罔効以鈚針砭之五七度腫減三日方平血出盈斗

一婦產後忽生虫一對于地能行長寸餘自後月生一對醫以苦參加打虫藥爲丸服之又

生一對埋于土中過數日發而視之暴大如拳名子母虫從此絶根

一婦眼中忽有血如射而出或緣鼻流下但出血多時即經不行乃陰虛相火之病遂用歸身尾生地紅芍加柴胡黃栢知母條芩側栢葉木通桃仁紅花水煎食前服數帖而愈

一婦妳頭裂用秋後嫩茄子綻開頭者陰乾燒爲末水調服愈

治身被鬼擊有青痕作痛以金銀花煎酒服

一人患腦疽面目腫閉頭瘃如斗此膀胱濕熱所致以黃連消毒飲二劑次以槐花酒二碗頓退以指按下腫即復起此膿已成也於頸額肩頰各刺一孔膿並湧出口目始開更以托裏藥加金銀花連翹三十劑全愈

紅絲瘤東垣云李叔和問中年得一子一歲後身生紅絲瘤而死後四子皆然何也曰汝乃腎中伏火精內有紅絲故也俗名胎瘤汝試取精觀之果如其言遂以滋腎丸數服其妻

服六味地黃丸乃受胎生子前證不復作矣

蛇入人竅中急以手捻定以刀刮破尾以椒或辛辣等物置尾以綿繫之即自出不可拔

一婦人產後日食茶粥二十餘碗一月後遍身冰冷數塊以指按其冷處即冷從指下上應至心如是者二年諸治不効以八物湯去地黃加橘紅入姜汁竹瀝一酒鍾十服乃温

一人頸項腫與頭相統按之堅硬用漏蘆湯一劑服下發痒頃刻消散

治婦盤腸產者臨產即子腸先出而後產子產子之後其腸不收以醋半盞冷水七分調勻噴婦面三噴則腸收盡此良法也

丹溪治一婦產戶下一物如帕有尖約重一斤却喜血不盡虛急與黃芪白朮升麻各五分人參當歸各一錢水煎連服三劑即收上

夏月中寒一人暑月行百里渴而飲山水至晚以單蓆陰地上少睡頃間寒熱吐瀉身如刀刮而痛醫皆曰中暑也進黃連香薷飲不應

予診其脉細緊而伏此中寒也衆皆笑曰六月中寒有是事乎予以附子理中湯治之六服乃瘳

冬天傷暑一婦冬月患洒洒惡寒翕翕發熱惡食乾嘔大便欲去不去諸醫皆虛弱用滌痰二陳湯不効後請予治脉虛無力予曰類乎傷暑衆以爲不然予究之婦曰昨因天寒令取綿套盖之因得此症予曰誠哉傷暑也汝之綿套晒之盛暑熱收箱中必有暑氣今躰

虛得之易入故病如是婦曰然遂用黃連香薷飲進二服其病瘳矣噫冬天傷暑夏月中寒病亦鮮見醫家問切之功活變之法不可不知也

一人耳內有丁如棗核大痛不可動一待詔用火酒滴耳內令仰上半時以鉗取出絶根

一婦産後因子死經斷不行者半年一日小腹忽痛陰戶內有物如石硬塞之而痛不禁衆醫不識青林曰此石瘕病也用四物加桃仁

大黃三稜柴榔玄胡索附子澤瀉血竭爲湯二劑而愈

一人左手無名指爪角生一小瘡初起麻粒大用小刀挑開瘡頭血出如濁不止一日夜長出肉瘤如菌裹指頂內開一孔如一眼目轉動此疔毒也以艾炙四十壯不知疼痒復烙之剪去肉瘤敷拔疔散外以膏藥貼之內服解毒湯七日全愈

一少年新婚欲交媾女子阻之乃逆其意遂陰

痿不舉者五七日以禿筆頭燒灰酒調服一二錢頃即起

一人當額害楊梅瘡一箇數年不愈一方士治之先用藥爛去瘀肉見內有骨一片如錢大取而去之治仍不效復爛之又有骨一片再取去敷生肌散收口而愈

怪疴單終



王雲五主編

叢書集成初編

活法機要及其他一種

中華民國二十六年十二月初版

發行人　王雲五　長沙南正路

印刷所　商務印書館

發行所　商務印書館　各埠